

Handleiding medicijngebruik 2026

Voor u ligt de nieuwste versie van de handleiding medicijngebruik voor de varkensbedrijven van De Varkenspraktijk. In deze handleiding medicijngebruik zijn opgenomen: uitleg voor verantwoord medicijngebruik, de positieve lijst en de vaccinlijst

Sinds 1 januari 2017 is de UDD-regeling aangepast. De UDD-regeling bepaalt dat antibiotica uitsluitend na diagnose en op voorschrift van een dierenarts mogen worden gebruikt. In de UDD-regeling krijgen alle antibiotica de UDD status: dat betekent dat ook **de toediening** in beginsel uitsluitend door de dierenarts plaatsvindt.

Onder bepaalde voorwaarden mag de dierenarts antibiotica afgeven aan een varkenshouder en mag de varkenshouder zelf over gaan tot individuele behandeling van zieke dieren.

- Er is een 1 op 1 overeenkomst tussen de varkenshouder en een geborgde varkensdierenarts
- De geborgde varkensdierenarts bezoekt maandelijks het bedrijf
- De dierenarts maakt een verslag van het maandelijks bezoek
- Er is een actueel bedrijfsbehandelplan (BBP) en een bedrijfsgezondheidsplan (BGP).

2^e keus middelen

Vanaf 1 januari 2017 zijn de voorwaarden veranderd waaronder tweede keuze middelen op een bedrijf aanwezig mogen zijn en die door u als veehouder zelf mogen worden ingezet voor behandeling van individuele dieren. Voor maximaal drie aandoeningen die op het bedrijf vaak voor problemen zorgen en waar acuut handelen noodzakelijk is, mogen tweede keuze middelen op voorraad zijn.

Hier gelden de volgende voorwaarden:

- De dierenarts heeft aangetoond dat een 1^e keus middel niet of onvoldoende werkt en een behandeling met een 2^e keus middel noodzakelijk is. Dit wordt vermeld in het bedrijfsgezondheidsplan. Tevens hebben de dierenarts en varkenshouder preventieve maatregelen in het bedrijfsgezondheidsplan opgenomen om de inzet van 2^e keusmiddelen te verminderen.
- Deze 2^e keusmiddelen moeten in het bedrijfsbehandelplan staan vermeld.
- In het geval er sprake is van een bedrijf met biggen van 8 weken leeftijd of jonger is een tweewekelijks bezoekenregime verplicht bij inzet van tweede keuze middelen.

Voor bedrijven die de afgelopen 3 halve jaren in het groen hebben gezeten voor alle diercategorieën gelden de volgende vrijstellingen:

- Het evalueren van het antibioticagebruik bij elk regulier bedrijfsbezoek.
- Het jaarlijks aanscherpen van de reductiedoelstellingen.
- De verplichting tot een 2-wekelijks bezoek bij inzet van een 2^e keusmiddel. In plaats van een visite kan worden volstaan met een contactmoment tussen de varkenshouder en de dierenarts.
 - Binnen 24 uur na eerste inzet 2^e keusmiddel is er contact tussen dierenarts en varkenshouder
 - De dierenarts legt schriftelijk het contactmoment vast en stelt de periode van inzet van het 2^e keusmiddel vast.

Voorraad

Naast de maximale voorraad aan eerste keuze middelen (15% van de aanwezige en voor de aandoening vatbare dieren) geldt er ook een maximale voorraad aan tweede keuze middelen (10% van de in een afdeling aanwezige en voor de aandoeningen vatbare varkens).

De afvoerplicht voor tweede keuze middelen vervalt: voor alle antibiotica geldt dat middelen die over zijn met een nieuwe instructie van de dierenarts gebruikt kunnen worden.

Vanaf 1 januari 2015 is er, naast de categorie zeugen en vleesvarkens, een derde categorie bijgekomen voor het bijhouden van de dierdagdoseringen, namelijk gespeende biggen. Dit betekent dat de medicijnen moeten worden geboekt op het goede logboek. Graag met het doorgeven van de bestelling daar ook rekening mee houden.

De koppelmedicatie middelen mogen NIET op een bedrijf op voorraad aanwezig zijn, maar mogen alleen aanwezig zijn na voorschrijving door een dierenarts voor een bepaalde koppel varkens gedurende de kuur.

Aandachtspunten voor het gebruik en de opslag van medicijnen

- **Lees altijd goed de bijsluiter vóór gebruik van de medicijnen!**
- Raadpleeg de bijsluiter voor de juiste bewaartemperatuur.
- Aangeprikte flesjes zijn slechts beperkt houdbaar (meestal slechts een maand).
- Probeer zo nauwkeurig mogelijk te doseren, er zijn medicijnen die bij overdosering negatieve bijwerkingen hebben.
- Jonge biggen mogen nooit tegelijk met een ijzerinjectie, een injectie met een oxytetracycline-preparaat krijgen.
- Om spuitplekken bij varkens te voorkomen, moet gebruik gemaakt worden van scherpe, schone naalden en een schone injectiespuit.
- Sinds september 2017 zijn de **wettelijke wachttijden** gelijk aan de **IKB wachttijden**. De **wachttijden** vindt u in deze positieve lijst. Deze wachttijden dienen minimaal nageleefd te worden.
 - Wachttijden worden door de fabrikanten gegeven met een zekere veiligheidsmarge, ze worden echter bepaald aan de hand van de uitscheidingsduur bij gezonde dieren. Er zijn factoren waardoor de uitscheidingsduur wordt verlengd en dus de wachttijd langer wordt, bijvoorbeeld ziekte van het dier of irritatie op de injectieplaats.
 - Individuele verschillen kunnen voorkomen.
- Indien er twijfels zijn omtrent het gebruik en/of de wachttijd, raadpleeg uw dierenarts.
- Vermijd bij gebruik van diergeneesmiddelen ieder contact met huid, ogen, en slijmvlies!
- Diergeneeskundige preparaten worden niet meegegeven aan personen die jonger zijn dan 12 jaar.
- Zorg ervoor dat de naalden scherp en lang genoeg zijn voor de diergroep waar U ze voor gebruikt.
 - Voor biggen 10-15 mm lengte
 - Voor 20-50 kg 25 mm lengte
 - Voor 50-120 kg 35 mm lengte
 - Voor zeugen 35-50 mm lengte

Tips voor goed vaccineren:

- Goede planning en voorbereiding is het halve werk
- Bewaar het vaccin onder de juiste omstandigheden: 2-8 ° C, niet invriezen, donker
- Bereken vooraf het aantal te enten dieren
- Zet geen aangeprikte flacons terug in de koelkast
- Levende entstoffen moeten na aanbreken onmiddellijk volledig gebruikt worden
- Werk steeds volgens het “first in-first out”-principe. Zo voorkomt u vervallen flacons in de koelkast
- Laat het vaccin op kamertemperatuur komen: minimaal 5 uur voor vaccinatie uit de koelkast
- Gebruik schoon injectiemateriaal: zowel spuiten als wegwerpnaalden
- Gebruik de juiste naaldafmeting voor de juiste diercategorie
- Reinig de injectiespuiten grondig met warm water na gebruik, zowel aan de buiten- als binnenkant.
- Intramusculaire injectie op de juiste locatie: 2-vinger regel. 1 vinger achter het oor en 1 vinger onder de neklijn
- Vaccineer enkel gezonde dieren
- Lees de bijsluiter voor het combineren van vaccins
- Evalueer het geheel op regelmatige basis aan de hand van een checklist

Positieve lijst - Addendum Bedrijfsbehandelplan

Antibiotica – 1e keus voor individuele behandeling

1 ^e keus antibiotica voor intramusculaire (= in de spier) toediening					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering (ml per kg l.g.)	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
(Procaine) Penicillinen					
Depocilline	IKB: 6	1 ml per 20-25 kg	3	4259	Bewaren in de koelkast
Penject 30	IKB: 9	1 ml per 10 kg	3-5	9332	Bewaren in de koelkast
Procapen 300 mg/ml	IKB: 15	1 ml / 15 kg	3	102321	Bewaren in de koelkast
Procpen 30	IKB: 5	1 ml per 30 kg	3-5	9933	Bewaren in de koelkast
Tetracyclinen					
Alamycin LA 200 mg/ml	IKB: 20	1 ml / 10 kg	Eénmalig	2738	
Cyclosol LA	IKB: 28	1 ml per 10 kg	Eénmalig, evt. herhalen na 3 dgn	10105	
Engemycine 10%	IKB: 18	1 ml per 12,5 kg	Max. 5	8291	
Oxy LA	IKB: 21	1 ml per 10 kg	Eénmalig	8067	
Oxyject 10%	IKB: 14	1-2 ml per 10 kg	3-5	8515	
Oxymax 100 mg/ml	IKB: 21	1- 2 ml per 10 kg	3-5	112077	
Trimethoprim Sulfonamiden					
Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml	IKB: 20	1 ml per 16 kg	Max. 5 dagen	123480	Niet bij vleesvarkens
Dofatrim-ject 40/200 mg/ml	IKB: 7	1 ml per 10-15 kg	3	8762	Niet bij vleesvarkens
TMP/SMZ INJ	IKB: 12	1 ml per 10 kg verdeeld over 2 doses	5	8068	Niet bij vleesvarkens
Fenicolen					
Flordofen	IKB: 18	1 ml per 20 kg	2 maal met een interval van 48 uur	112951	
Florkem	IKB: 18	1 ml per 20 kg	2 maal met een interval van 48 uur	102429	
Macroliden					
Tylan 200	IKB: 16	1 ml per 20-40 kg	3-5	10100	
Tylosine 20% pro inj.	IKB: 16	1 ml per 20-40 kg	3 tot max 5	8296	
Pharmasin 200 mg/ml	IKB: 16	1 ml per 20-40 kg	3	118242	
Pleuromutilinen					
Denagard 10%	IKB: 14	1 ml per 5-10 kg	éénmalig	8014	
Vetmulin 162 mg/ml	IKB: 21	1-1,5 ml per 20 kg	1-3	102811	

1 ^e keus antibiotica voor uitwendig gebruik					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Tetracyclinen					
CTC-spray	0	3 sec op 15-20 cm	Eénmalig	9013	
Engemycine spray	0	1-2 sec op 15-20 cm	elke 12 uur herhalen, 1-3 dgn	102670	

Antibiotica – 1e keus voor koppelbehandeling (alleen na voorschrijven door een dierenarts)

1 ^e keus antibiotica voor orale toediening via drinkwater					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering (ml of gr per kg l.g.)	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Tetracyclinen					
Doxycycline HCL	IKB: 5	1 gr per 100 kg	3-5	1509	
Doxylin 100%	IKB: 8	1 gr per 100 kg	3-5	110817	
Oxytetracycline-HCL	IKB: 5	2-4 gr per 100 kg	3-5	9617	Verdeeld over 2 porties
Soludox 50%	IKB: 4	2,5 gr per 100 kg	4	10275	
Trimethoprim Sulfanamiden					
Hydrotrim	IKB: 12	5 gr per 100 kg	4 – 7	130066	
Metaxol	IKB: 8	1 ml per 4 kg	4 – 7	117064	
Trim/Sul 80/420	IKB: 28	5g per 100 kg	max. 5	2213	Verdeeld over 2 porties
T.S.Sol 20/100	IKB: 8	2,5 ml per 10 kg	4 – 7	7611	
Macroliden – zie bijsluiter: specifieke dosering per indicatie					
Tildosin	IKB: 14	6-8 ml / 100 kg	5	120440	
Tilmovet 250mg/ml	IKB: 14	6-8 ml per 100 kg; 80 ml per 100 L	5	10560	
Tylan W.O.	IKB: 1	0,5 - 2 gr / 100 kg	7 - 10	9984	
Tylogran 1000mg/g	IKB: 1	0,55-2,2 gr per 100 kg	7-10	10213	
Pleuromutilinen – zie bijsluiter: specifieke dosering per indicatie					
Vetmulin 450mg/g	IKB: 2-4	19,6-44,4 mg per kg	3-5	10552	
Penicillines					
Phenoxyphen WSP 325 mg/g	IKB: 4	5,1 g / 100 kg	5	10333	

1 ^e keus antibiotica voor orale toediening als topdressing					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering (ml of gr per kg l.g.)	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Tetracyclinen					
Oxy 500 topdressing	IKB: 14	1 gr per 2,5-5 kg	max. 7	10370	
Trimethoprim Sulfanamiden					
Feedmix TS topdressing	IKB: 3	1 gr per 2-4 kg	4-7	9529	
Trimethosulf topdressing	IKB: 5	1 gr per 2,5-5 kg	5-14	8017	
Macroliden					
Tilmovet 100	IKB: 21	16 gr per 100 kg	15	103646	

Antibiotica – 2e keus voor individuele behandeling (alleen na voorschrijven door of contact moment met de dierenarts)

2 ^e keus antibiotica voor intramusculaire (= in de spier) toediening					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering (ml per kg l.g.)	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Penicillinen (2e keus)					
Albipen LA	IKB: 28	1,5 ml per 10 kg	2 maal met een interval van 48 uur	7828	
Ampicillan 20%	IKB: 14	1 ml per 10 kg	3-5	9105	
Ampicilline 20% pro inj.	IKB: 14	1 ml per 10 kg	3-5	8480	
Amoxicilline 150 INJ	IKB: 42	1 ml per 15 kg	3	8787	
Trymox LA 150 mg/ml	IKB: 42	1 ml per 10 kg	2 maal met een interval van 48 uur	122909	
Penicilline + Streptomycine					
Penstrep-ject	IKB: 49	1 ml per 20 kg	3 dagen	100679	
Tulathromycine					
Draxxin	IKB: 13	1 ml per 40 kg	éénmalig	10183	Max. 2ml per injectieplaats
Draxxin 25	IKB: 13	1 ml per 10 kg	éénmalig	115258	
Increxxa 100mg/ml	IKB: 13	1 ml per 40 kg	éénmalig	125739	
Tulissin 100mg/ml	IKB: 13	1 ml per 40 kg	éénmalig	124431	
Tulissin 25 mg / ml	IKB: 13	1 ml per 10 kg	éénmalig	124428	
Tuloxxin 100 mg / ml	IKB: 13	1 ml per 40 kg	éénmalig	122430	
Doraxx 100mg / ml	IKB: 13	1 ml per 40 kg	éénmalig	126606	
Lincomycine + spectomycine					
Lincomycine-spectinomycine	IKB: 21	1 ml per 10 kg	max. 3	8271	

Antibiotica – 2e keus voor koppelbehandeling (alleen na voorschrijven door een dierenarts)

2 ^e keus antibiotica voor orale toediening					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering (ml of gr per kg l.g.)	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Penicillinen (2^e keus) drinkwater					
Amoxy active 131 mg/g	IKB: 8	1 gr per 10 kg	3-5	7324	
Amoxy active 697mg/g	IKB: 2	1,6 gr per 100 kg	3-5	113695	
Octacilline	IKB: 2	0,8-1,6 gr per 100 kg 10-30 g per 100 L	3-5	10112	
Suramox 50%	IKB: 14	4 g per 100 kg	5	9872	Stabiel in brijvoer
Apramycine door het drinkwater					
Apravet 552 000 IE/g	IKB: 0	2,25 g per 100 kg	7	118582	
Colistine door drinkwater					
Colisol 5 liter	IKB: 1	40 ml per 100 kg	3-5	2182	
Coldostin 4 800 000	IKB: 1	1 g per 48 kg/lg	3-5	117624	
Lincomycine en spectinomycine door het drinkwater					
Lincoral-S 222 mg/g + 444,7 mg/g	IKB: 0	1,5 g per 100 kg	7	129389	
Neomycine door drinkwater					
Neosol 100%	IKB: 21	10mg/kg	3-5	104343	2 - 4 porties
Colistine als topdressing					
Colistine 1200 topdr	IKB: 7	12,5 gr per 100 kg	3-5	5901	

Overige medicijnen

Pijnstillers					
Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
NSAID's – injectie (in de spier)					
Ketofen 10%	5	3 ml/100 kg l.g.	Eénmalig	8784	Max. 1,7 ml per injectieplaats
Aristal 100mg/ml	4	3 ml/100 kg l.g.	Eénmalig	112051	Max. 5 ml per injectieplaats
Melovem 5	5	1 ml/12,5 kg l.g.	Eénmalig	103350	
Melovem 20	5	1 ml/50 kg l.g.	Eénmalig	112953	
Melovem 30	5	1 ml/75 kg l.g.	Eénmalig	112952	
Novem 20	5	2ml/100 kg l.g.	Eénmalig	10219	

Vetalgin	17	15-20 ml/100 kg l.g.	Eénmalig	8680
NSAID's – oraal (door drinkwater)				
Dophacyl	0	3,5 gr/100 kg	3-5	129792
Na-salicylaat	0	3,5 gr/100 kg	3-5	8913
Pyrocam 15mg/ml	4	2,7 ml/100 kg	Evt herhalen na 24 uur	130046
Solacyl 100%	0	3,5 gr/100 kg	3-5	10444
Corticosteroïden– injectie (in de spier)				
Dexaject	2	1,5 ml/50 kg		112615
Alfadexx	2	1,5 ml/50 kg		127107
Pijnstiller voor maagdarmkanaal – injectie (in de spier)				
Buscopan compositum-IM	15	1 ml/20 kg l.g.	Eénmalig	8944

Hormonen

Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Hormonen – injectie					
Dinolytic 5mg/ml	0	2 ml per dier	Eénmalig	9242	
Longacton	0	1 ml per dier	Eénmalig	108392	
Maprelin	0	0,5 ml - 2,0 ml	Eénmalig	103809	
Oxytocin-ject	0	2-3 ml per dier	Eénmalig	3030	
PG 600	0	5 ml per dier	Eénmalig	1560	
Planate	1	2 ml per dier	Eénmalig	5294	
Hormonen – oraal					
Regumate Pig	9	5 ml per dier	18	5745	

Supplementen

Medicijn	Wachttijd (dagen)	Dosering (ml per kg l.g.)	Behandelingsduur (dagen)	REG NL	Opmerking
Vitaminepreparaten – injectie					
Etosol-SE	0	1 ml/10 kg l.g. Big: 0,2 ml/kg l.g.	Eénmalig	1289	Big onder de huid spuiten
Multivitamin Pro inj.	0	0,5 – 5ml per dier	Eénmalig	3190	
Vitolject Forte	0	1-4 ml per dier		4142	
Vitamine– via drinkwater					
PHCM	0	0,2-5g per liter water oplossen	3-5	98057	

IJzerpreparaten – injectie				
Ironject 20% + B12	0	0,75-1 ml per dier		3159
Forceris	70	1,5 ml per dier	Eenmalig	121805
Prevan 200 + B12	0	1 ml per dier		2444
Prevan 200	0	1 ml per dier	Eenmalig	9475
Baycox Iron	53	1ml per dier	Eenmalig	122281
MS Super Forte+Vit B12	0	1 ml per dier	Eenmalig of 0,5 verdeeld over 2 doses	10328

Elektrolyten – oraal in het drinkwater				
Euroelectrol oraal	0	2,5 g/100ml/kg	-	
Lianol colostro	0			
Tonistry Px	0	310 g / 10 L water		

Ontworming en middelen tegen coccidiose					
<i>Medicijn</i>	<i>Wachttijd (dagen)</i>	<i>Dosering/ toedieningsplaats</i>	<i>Behandelingsduur (dagen)</i>	<i>REG NL</i>	<i>Opmerking</i>
Ontworming – injectie					
Alfamec 1%	28	1ml/33 kg l.g.	éénmalig	10281	
Dectomax	77	1 ml/33 kg l.g.	éénmalig	9844	Max. 2,3 ml per injectieplaats
Iverveto 1%	28	1 ml/33 kg l.g.	éénmalig	10547	Onder de huid
Levamisol 10% inj.	28	1 ml/20 kg l.g.	éénmalig	1716	
Noromectin injectie	18	1ml/33 kg l.g.	éénmalig	10107	Onder de huid
Ontworming – topdressing					
Curofen	6	1gr/10 kg l.g.	Eénmalig	116271	
Flubendazole 5% topdressing	5	1g/10 kg l.g.	éénmalig	101467	
Flubenol 5%	5	1g/10 kg l.g.	éénmalig	10347	
Pigfen 40mg/g	4	0,9-12,5g/100 kg l.g.	1-14	115523	
Ontworming – attest					
Flutelmium 0,6%	5	5 kg/ 1000 kg voer	5	6082	
Feedmix Fludoprex 0,6%	5	5 kg / 1000 kg voer	5	101512	
Ontworming – oraal (drinkwater)					
Leva oraal 10% 5L	15	1 ml/ 10 kg	éénmalig	8957	
Anti coccidiose – oraal					
Baycox multi 50mg/ml	77	0,4ml/kg l.g.	éénmalig	118580	

Dozuril 50mg/ml	61	0,4ml/kg l.g.	éénmalig	112775
Tolracol	77	0,4ml/ kg l.g.	Eénmalig	114467
Anti coccidiose + ijzer – oraal				
(Baycox Iron)	53	1ml per dier	Eénmalig	122281
Forceris	70	1,5 ml per dier	Eénmalig	121805

Overige medicijnen					
<i>Medicijn</i>	<i>Wachttijd (dagen)</i>	<i>Dosering (ml per kg l.g.)</i>	<i>Behandelingsduur (dagen)</i>	<i>REG NL</i>	<i>Opmerking</i>
Kalmeringsmiddel (injectie in de spier)					
Stresnil 40mg/ml	18	0,25-0,5 ml/10kg		3153	Max. 5ml per injectieplaats
Separon 40mg/ml	18	0,2-1 ml/20 kg		126351	
Azaporc 40mg/ml	18	0,2-1ml/20kg		127527	
Hulpmiddel bij diarree big					
Kaopectate	0	30-120 ml/dier/dag Verdelen 3-4 doses	2-3	3045	

Vaccinlijst

Aandoening	Naam Vaccin	REG NL	Dosering
APP			
	Coglapix	115299	2 ml
	Fixr APP 2, 9, 11	123995	1 ml !
	Neumosuin *	-	2 ml
	Porcilis APP	8520	2 ml
	Suivac APP	124394	2 ml
Atrofische Rhinitis			
	Porcillis ART DF	9923	2 ml
	RhiniSeng	105581	2 ml
Circo			
	Circomax	126964	2 ml / 2x 1ml
	Circovac	10567	0,5 ml (big) ! 2 ml (zeug)
	Ingelvac Circoflex	102672	1 ml !
	Porcilis PCV	102344	2 ml
	Porcilis PCV ID	115932	0,2 ml
Clostridium/E.Coli			
	Entericolix	115751	2 ml
	Enteroporc Coli	125073	2 ml
	Enteroporc Coli AC	124902	2 ml
	Fixr Rota Coli / Clostri	131335	2 ml
	Porcilis Coliclos	108819	2 ml
	Suiseng Coli C	125985	2 ml
	Suiseng Diff/A	127115	2 ml
Coli			
	Coliprotec F4/F18 (biggen)	118799	2 ml
	Ecoporc Shiga (biggen)	111263	1 ml !
	Fixr Rota Coli	123686	2 ml
	Porcilis porcoli DF	10099	2 ml
	Vepured (biggen)	119414	1 ml !
Haemophilus Parasuis / Glässer			

Porcilis Glässer	10172	2 ml
Fixr HP ery	124851	2 ml
Influenza		
Respiporc Flu 3	103467	2 ml
Gripork*	-	1-2 ml (big) ! 2 ml (zeug)
Respiporc Flu Pan H1N1	118267	1 ml !
Leptospirose		
Fixr Parvo Lepto	125629	2 ml
Porcilis Ery + Parvo + Lepto	117666	2 ml
Mycoplasma		
Mycoflex (1-shot)	104086	1 ml !
Suvaxyn MH one (1-shot)	102300	2 ml
Suvaxyn M Hyo	7785	2 ml
Stellamune One (1-shot)	10190	2 ml
Stellamune mycoplasma	8215	2 ml
Porcilis M. Hyo ID (1-shot)	107951	0,2 ml
Hyogen (1-shot)	114985	2 ml
Circo/Mycoplasma		
Porcilis PCV M Hyo	114735	2 ml / 2x 1ml
Porcilis PCV M Hyo ID	107951	0,2 ml
CircoMax myco	125737	2 ml / 2x 1ml
Mhyosphere PCV ID	124922	0,2 ml
Parvo		
Porcilis Parvo	7387	2 ml
Parvoject	7677	2 ml
ReproCyc Parvoflex	122784	2 ml
PIA		
Enterisol Ileitis	10302	2 ml
Porcilis Lawsonia	123502	2 ml
PRRS		
Porcilis PRRS	9815	IM 2 ml ID 0,2 ml
Ingelvac PRRS MLV	8749	2 ml

Suivac PRRS inac.	97/112/04-C	2 ml
PRRS flex	115061	1 ml !
ReproCyc PRRS EU	115087	2 ml
Suvaxyn PRRS MLV	119564	2 ml
Unistain PRRS	110841	IM 2 ml ID 0,2 ml
FIXR PRRS Inac	125906	2 ml
Rotavirus		
Bovigen Scour *	117300	1,5 ml
Fencovis *	128448	2 ml
Fixr Rota Coli	123686	2 ml
Vlekziekte		
Eryseng	113464	2 ml
Porcilis Ery	8654	2 ml
Ruvax	2820	2 ml
Fixr Ery One	12676	2 ml
Vlekziekte/Parvo		
Eryseng parvo	113466	2 ml
Porcilis Parvo + Ery	8726	2 ml
Parvoruvax	4217	2 ml
Salmonella		
Salmoporc	122671	1 ml
(let op: onder de huid vaccineren bij gelten & zeugen, oraal bij biggen)		

*Inzet volgens cascadereregeling.